# Acrux 32,87EC

## INGREDIENTE ACTIVO

**Nombre Común**

| | |
|---|---|
| Difenoconazole | 250 g/l (25%) |
| Pyraclostrobin | 78.7 g/l (7.87%) |

**Nombre Químico**

Difenoconazole: cistrans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- 1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Pyraclostrobin: Methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl}(N-methoxy)carbamate

**No. CAS**

| | |
|---|---|
| Difenoconazole | 119446-68-3 |
| Pyraclostrobin | 175013-18-0 |

## FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| **Estado físico:** | Líquido |
| **Color:** | Amarillo |
| **Densidad:** | 1.0374 g/cm$^3$ |
| **Estabilidad:** | Estable bajo condiciones normales de almacenamiento |

## MODO DE ACCIÓN

**Acrux 32,87EC** es un fungicida con acción protectante y curativa. Absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal. Inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1.

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con equipo manual de espalda, motorizado o con equipo terrestre acoplado al tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

## MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea.

## USOS Y DOSIS

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS |
|---|---|---|
| CAFÉ ***Coffea* spp** | Roya ***Hemileia vastatrix*** | 0.5-0.75 L/Ha |
| TABACO ***Nicotiana tabacum*** | Moho azul del tabaco ***Peronospora tabacina*** | 0.75-1.0L /ha |
| MANÍ ***Arachis hypogea*** | Roya ***Puccinia arachidis*** | 0.75-1.0L /ha |
| BANANO Y PLÁTANO ***Musa* sp.** | Sigatoka negra ***Mycosphaerella fijiens*** | 0.5 - 1 L/ha |

## AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

## CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

!
**ATENCIÓN**

## PRESENTACIONES

100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l,10 l, 20 l, 200 l

## REGISTRO

**Nicaragua: INT-04F-2016**

**Formulador:**
**INTEROC S.A**.
Km 16.5 Vía Daule, Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

**TITULAR DEL REGISTRO**
**INTEROC CUSTER S.A.**
Alajuela, Costa Rica