Ligustro
Herbicida

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

2,4-D	120 g/L (12%)
Picloram	200 g/L (20%)
Fluroxipir	80 g/L (8%)

Nombre Químico

2,4-D Ácido:
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid

Picloram Ácido:
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid

Fluroxypyr Ácido:
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

FORMULACIÓN

Microemulsión (ME)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Ámbar
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Densidad: 1,450 g/ml a 20 °C

MECANISMO DE ACCIÓN

Ligustro 40ME 2,4-D: Herbicida sistémico selectivo. Las sales se absorben fácilmente mediante las raíces, mientras los ésteres se absorben por el follaje. La translocación ocurre, como una acumulación principalmente en las regiones meristemáticas de brotes y raíces. Actúa como inhibidor de crecimiento. Picloram y fluroxypyr: Son herbicidas sistémicos selectivos, absorbidos rápidamente por raíces y hojas, y trasladadas de manera acropetal y basipetal, acumulándose en nuevos brotes.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde al área a tratar. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de Ligustro 40ME de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea. Utilizar el producto con Maxicover 99.2 L y Optiwater 25 L.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
PASTOS	Cornizuelo ***Acacia cornigera*** Bledo ***Amaranthus* sp.** Vivorona ***Asclepias curassavica*** Platanillo ***Cleome viscosa*** Pega – pega ***Desmodium tortuosum*** Cola de alacrán ***Heliotropium indicum*** Campanilla ***Ipomoea* sp.** Cinco negritos ***Lantana cámara*** Zarza ***Mimosa pigra*** Dormilona ***Mimosa púdica*** ***Mimosa tenuiflora*** Verdolaga ***Portulaca oleracea*** Escoba lisa ***Sida acuta*** Escoba dura ***Sida rhombifolia*** Peludo ***Waltheria americana***	1.5 L/Ha, 2 L/Ha y 2.5L/Ha	Aplicar cuando haya presencia de la maleza, y que no sobrepase el 10% de la cobertura del pasto.

INTERVALO DE APLICACIÓN

Se recomienda una única aplicación

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3

PELIGRO

PRESENTACIONES

50 ml, 60 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml ,1 L, 200 L

REGISTRO

Honduras: 1464-873-I
Nicaragua: INT-59S -2021
Panamá: 10627

Formulador:
INTEROC SA.
km 16.5 Vía Daule. Guayaquil-Ecuador Telf.: (593 - 4) 216 – 2608

DIRECCIÓN:
Del cruce de Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER