INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Thiamethoxam 250 g/kg (25.0%)

Nombre Químico
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazin-4—ylidene(nitro)amine

No. CAS
153719-23-4

FORMULACIÓN

Gránulos Dispersables

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Café claro a café oscuro
Olor: Característico (Rancio)
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

MODO DE ACCIÓN

ACT UP 25 WG es un insecticida neonicotinoide, inhibidor de los receptores nicóticos de la acetilcolina-nicotidamina en el sistema nervioso de la plaga con acción de contacto e ingestión de la plaga.

MECANISMO DE ACCIÓN

ACT UP 25 WG es un insecticida de acción sistémica. Neurotóxico, que inhibe competitivamente al acetil colinesterasa, impidiendo que esta última degrade a la acetilcolinesterasa.

RECOMENDACIONES DE USO

ACT UP 25 WG se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usado.

MODO DE APLICACIÓN

Diluir el producto en la cantidad de agua que se utilizará en la aspersión, agitar la mezcla. El producto puede ser aplicado con equipos de aspersión terrestre en alto o bajo volumen. No aplicar el producto cuando esté por llover.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Mosca blanca ***Bemisia spp.*** Áfidos ***Aphis sp.*** ***Myzus sp.*** ***Macrosiphum spp.***	0.05-0.4 kg/ha
ARROZ ***Oryza sativa***	Áfidos ***Aphis sp.***	0.05-0.4 kg/ha
MELÓN ***Cucumis melo***	Áfidos ***Aphis sp.*** ***Myzus sp.*** ***Macrosiphum spp.*** Mosca blanca ***Bemisia tabaco*** ***Trialeurodes spp.***	0.25-0.4 kg/ha
TABACO ***Nicotiana tabacum***	Áfidos ***Aphis sp.*** Mosca blanca ***Bemisia tabaci***	0.05-0.4 kg/ha
CHILE ***Capsicum sp.***	Áfidos ***Trialeurodes spp.*** ***Aphis sp.*** ***Myzus sp.*** ***Macrosiphum spp.***	0.05-0.4 kg/ha
PASTOS ***Pennisetum clandestinum*** ***Brachiaria decumbens***	Baba de culebra ***Prosapia plagiata***	0.1-0.3 kg/ha
NARANJA ***Citrus sinensis***	Psílido asiático de los cítricos ***Diaphorina citri***	0.5-0.7 kg/ha

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA

Arroz: 30 días
Naranja: 15 días
Tomate, Melón, Chile: 3 días
Tabaco: 14 días
Otros cultivos: No aplicar 21 días antes de la cosecha.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

10 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg.

REGISTRO

Nicaragua: INT-01E-2016

Formulador:
TAGROS CHEMICALS INDIA LTD
Egmore, Chennai-India

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER