DUPLICE

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Cyhalofop-butyl 10% + Metamifop 10%

Nombre Químico
Cyhalofop-butyl: butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate

Metamifop: (R)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]-2′-fluoro-N-methylpropionanilide

No. CAS
Cyhalofop-butyl: 122008-85-9
Metamifop: 256412–89–2

FORMULACIÓN

Emulsión concentrada (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillo claro
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Explosividad:	No explosivo
Oxidante:	No oxidantes
Densidad:	1,0 g/mL
Olor:	Sin olor evidente
pH:	4,0 -7,0

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

DUPLICE 20 EC es una mezcla de dos ingredientes activos sistémicos para el control post-emergente de malezas gramíneas en arroz. La combinación de sus ingredientes activos actúa como inhibidor de la enzima Acetil Co A Carboxilasa haciendo una disrupción de la biosíntesis de ácidos grasos y formación de lípidos causando clorosis llevando a detención del crecimiento, necrosis y muerte.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
ARROZ DE INUNDACIÓN ***Oryza sativa***	Zacate de agua, ***Echinocloa*** **colunum** Falsa caminadora	2,0 L/ha Volumen de agua 200 L/ha	Realizar aplicaciones cuando la maleza tenga entre tres hojas a dos macollas máximo. Se recomienda el uso de Maxicover a la dosis de 0,2 mL/L de agua
	Ischaemum rugosum Plumilla ***Leptochloa*** **filiformis**		Se recomienda integrarlo en un plan de MIM (Manejo Integral de Malezas). Realizar únicamente una aplicación por ciclo.

Período de carencia: No aplica, porque la época de aplicación no genera riesgo de residuos a la cosecha.

Intervalo de reingreso al área tratada: Espere a que la aplicación haya secado, aproximadamente 12 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de portación personal.

MODO DE APLICACIÓN

Para el cultivo de arroz, se puede aplicar vía aérea con el uso de un coadyuvante. Se recomienda usar el coadyuvante siliconado Maxicover (0,3 ml/L). Se recomienda una realizar una sola aplicación en post emergencia temprana a la maleza.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

1 L, 3,785 L, 4 L, 5 L, 10 L, 18 L, 19 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L y 1000 L.

REGISTRO

Nicaragua: INT-87M-2025

Formulador:
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd.
East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China
ircamregulatorio@corpcuster.com

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
interoc@interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER