Savedra 24 SC

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Spirotetramat: 160 g/L(16,0%m/v)
Pyriproxyfen: 80 g/L (8,0%m/v)

Nombre Químico
Spirotetramat: cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
Pyriproxyfen: phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether

No. CAS
Spirotetramat: 203313-425-1
Pyriproxyfen: 95737-68-1

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanquecino
Estabilidad: Estable si es almacenado en su envase original, sellado y bajo condiciones normales de temperatura
Inflamabilidad: No es inflamable

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

SAVEDRA 24 SC, es una mezcla de dos ingredientes activos, el Pyriproxyfen es regulador del crecimiento de insectos que actúa por contacto e ingestión. Suprime la embriogénesis, inhibe la metamorfosis y la reproducción. Y el Spirotetramat actúa como inhibidor de la biosíntesis de lípidos después de la ingestión de la plaga. El compuesto 3(Spirotetramato) se somete a hidrólisis del enlace éster de la cadena lateral para formar un metabolito secundario o espirotetramato-enol. El espirotetramato-enol forma un ácido débil en el xilema y la savia del floema y se transloca bidireccionalmente por toda la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

Savedra 24 SC se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales, en equipos agrícolas, spray boom y equipo aéreo. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados previamente.

MODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con equipo, manual terrestre, bombas de mochila o adaptado a la fuerza del tractor. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta. Use boquillas de cono. Después de la aplicación, lave el equipo de aplicación, deje secar y guarde. Utilice el equipo de protección personal. No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Banano y plátano *Musa* spp	**Cochinilla** (*Dysmicoccus brevipes*)	0,8 – 1,2 L/ha Volumen de agua de 250 L/ha	**SAVEDRA 24 SC** se aplica de manera foliar y terrestre directa a la planta tratando de obtener una cobertura uniforme del cultivo.

Período de carencia:
Banano y plátano: 0 días

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

1L, 20L

REGISTRO

Nicaragua: INT-87H-2025

Formulador:
INTEROC S.A
Km. 16.5 Vía a Daule
Guayaquil - Ecuador
Tefl.: (593-4) 216-2608 ircamregulatorio@corpcuster.com

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica

DIRECCIÓN: Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – Alajuela
TELÉFONOS: (506) 2239-4298
WEB: Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER